

| 副作用 | 出現時の対策・日常生活における注意点 |
|----------------------------|--|
| 高血圧 | 我慢できないほどの頭痛や吐き気、意識がもうろうとする。治療として一般的な降圧薬による治療が行われます。急激に血圧が上昇して脳やその他の臓器に障害が生じることがあるため、治療期間中は定期的に血圧測定してください。安静時に測定した血圧で最大血圧が180mmHgもしくは最小血圧が120mmHgを超える場合も連絡してください。 |
| たん白尿 | 高血圧の方に出現しやすい傾向があります。治療期間中は、定期的に尿タンパクを測定します。 |
| 間質性肺炎 | 空咳、息切れ、発熱など 症状を感じたら受診し、適切な治療を受けてください。 |
| 血栓 (心筋梗塞、脳梗塞、狭心症 など) | 胸が痛む、胸がしめつけられる、意識を失いそうになる、ろれつがまわらなくなる、激しいめまいがする、突然息切れがする など 症状がみられた時は、すぐに連絡してください。 |

ここに書いてある以外の副作用が現れるかもしれません。普段と何か違うな、おかしいなと感じたときは医師、薬剤師、看護師に報告してください。

治療を受けているときは、様々な不安や疑問を感じると思います。
そのようなときは主治医、薬剤師または看護師にお気軽に相談してください。



鹿児島市医師会病院 化学療法委員会
099-254-1125